




สุบolson...ติดยาไม่ได้




ภาพสมองคนปกติ
มีเลือดมาเลี้ยงสมองอย่างเหมาะสม



ภาพสมองของคนที่เริ่มใช้ยาเสพติด
ลีดแดงตรวจกลางสมองมีลีเข้มมากกว่า
ในคนปกติ เพราะยาเสพติดเข้าไป
กระตุ้นสมองอย่างผิดธรรมชาติ



ภาพสมองของคนติดยาเสพติด
ลีดแดงตรวจกลางหายไปหมด
เนื่องจากสมองเลี้ยงการทำงาน
เพราผลการเสพยาเสพติดเป็นประจำ



ภาพสมองของคนติดยาที่ได้รับการรักษา
และเลิกใช้ยาเสพติดทุกชนิดเป็นเวลา ๒ ปี
ลีดแดง หมายถึง สมองบางล่วง
สามารถกลับมาทำงานได้ (แต่ไม่สมบูรณ์)

สังเกตอย่างไรว่า... ติดยา

- ▶ **สภาพร่างกาย** ทรุดโทรม น้ำหนักลดรวดเร็ว ไม่สัดส่วนแล้วใส อ่อนเพลีย หน้าซีด ผิวแห้ง มักจะเลียปากบ่อย ดื่มน้ำบ่อย ตาแดง ม่านตาขยาย นอนไม่หลับ หรือนอนมากผิดปกติ
- ▶ **บุคลิกเปลี่ยนแปลง** หงุดหงิดง่าย พูดหรือมีพฤติกรรมทำอะไรช้า ๆ กลับไปกลับมา หรือเคลื่อนไหวตลอดเวลา กัดฟันกรามบ่อย ๆ บังกีซึมเคราผิดปกติ บางทีไม่มีอารมณ์ความรู้สึก แต่งกายเปลี่ยน ๆ
- ▶ **การใช้เงิน** ขอเงินบ่อยขึ้น บางสิ่งที่บอกว่าจะซื้อแต่ไม่ได้ซื้อ หรือขอเงินไปใช้หนี้เพื่อนบ่อย เงินทอง ข้าวของ ในบ้านหายบ่อย ๆ
- ▶ **การทำงานແยลลง** ไม่สนใจทำงาน ขาดงานบ่อย
- ▶ **โภภกบอยซึ้น** มีความลับที่บอกไม่ได้บ่อย ๆ อึดอัดไม่สบสายตา ไม่รักษาคำพูด ผิดนัด ผิดเวลา ผิดข้อตกลง
- ▶ **สัมพันธภาพในครอบครัวเปลี่ยนไป** มักแยกตัวออกจากครอบครัว ไม่เข้ามาดูแลคล่องแคล่ว ไม่ร่วมกิจกรรมครอบครัว ไม่สนใจเรื่องราวของพื้นบ้าน แสดงออกถึงความรำคาญเมื่อคนไถ่ถามทุกข์สุข มักขัดแย้งทางความคิดกับคนรอบข้างเนื่อง ๆ ใช้เสียงดัง ก้าวร้าว ใช้กำลัง
- ▶ **อาจพบอุปกรณ์การเสพ** เช่น เข็ม หลอดกาแฟ แก้วน้ำ กระดาษฟอยล์ ไฟแช็ก กระดาษม้วน ภาชนะเสียบหลอด

พบรหินผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โทร. 1165 พบรหินผู้ค้า โทร. 1688



สำนักงานพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม www.oncb.go.th